

RACCOMANDAZIONE 1b

Author: Roberto Speziale

Response submitted on: lunedì, 9 marzo 2020, 12:07

| | |
|-----------------------|--|
| Nome stakeholder | Anffas Onlus |
| Categoria stakeholder | 2. Associazioni di pazienti e familiari/caregiver e rappresentanti dei cittadini |

QUESITO: Negli adulti con ASD, si dovrebbero utilizzare farmaci stimolanti vs. non utilizzare farmaci stimolanti?

RACCOMANDAZIONE 1b: Il panel ISS sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico (ASD) negli adulti suggerisce di non utilizzare i farmaci stimolanti in adulti con ASD senza co-occorrenza di ADHD (raccomandazione condizionata basata su una qualità? molto bassa delle prove di efficacia)

Si prega di indicare il proprio grado di accordo/disaccordo con ciascuna delle seguenti affermazione, utilizzando una scala da 1 a 5.

| | |
|---|---|
| 1: | 4 |
| La raccomandazione è formulata in modo comprensibile relativamente all'intervento che si raccomanda di utilizzare. | |
| 2: | 4 |
| La raccomandazione è formulata in modo che l'adesione alla raccomandazione sia facile da documentare e da misurare. | |
| 3: | 4 |
| La valutazione della forza della raccomandazione è coerente con le mie conoscenze e la mia valutazione delle prove. | |
| 4: | 4 |
| La valutazione della qualità delle prove è coerente con | |

RACCOMANDAZIONE 1b

Author: Roberto Speziale

Response submitted on: lunedì, 9 marzo 2020, 12:07

le mie conoscenze e con la mia valutazione delle prove

5:

4

Le nota aggiuntiva fornisce informazioni utili su come implementare la raccomandazione (se applicabile)

Risposta vuota

Nel caso in cui per una o più affermazioni il punteggio assegnato sia minore di 3, si prega di argomentare la scelta riportando i riferimenti bibliografici a supporto